Herbizide Körnerleguminosen 2021

Produkt	MoA[1]	Formulierung	Wirkstoff	Stadium	Kultur	maximale Dosis	Fuchsschwanz Windhalm	Flughafer	Rispe	Raygras	Quecke	Flohknöterich	Vogelknöterich	Windenknöterich	Bingelkraut	Distel (Acker-)	Erdrauch	Franzosenkraut	Gänsedistel	Hirtentäschel	Kamille	Klette	Melde & Weisser Gänsefuss	Nachtschatten	Persischer Ehrenpreis	Raps (Ausfall-)	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere	Winde (Acker-)	Bodenwirkung	Blattwirkung	Abstandsauflagen* & Abdriftminderung
							Ungräser					Knöterich																								
Herbizide gegen zweikeimblättrige Unkräuter:																																			
AZ 500	L	SC	500 g/l Isoxaben	BBCH 12 - BBCH 14	Ackerbohnen	0,1 l/ha	-	-	-	-	-	?	+	+	?	-	++	?	++	++	++	-	+++	?	++	+++	++	+	+++	++	++	x	-	**1 m** bei Einsatz herkömmlicher Technik
Fruchtfolge: Schäden an Folge- oder Ersatzkulturen können nicht ausgeschlossen werden. Unter der Verantwortung des Zulassungsinhabers sind geeignete Kulturen auf dem Etikett vermerkt.				2. Laubblatt bis 4. Laubblatt entfaltet																															
Basagran SG	C3	WG	870 g/l Bentazon	BBCH 11 - BBCH 12	Erbsen	1,1 kg/ha	-	-	-	-	-	++	(+)	++	++	-	++	++	++(+)	+	++(+)	-	++(+)	++(+)	(+)	?	-	++(+)	?	++(+)	-	-	x	**5 m** bei Einsatz herkömmlicher Technik
			Maximal 960 g vom Wirkstoff / ha / 12 Monaten. Bentazon darf ebenfalls noch bei der Grassaatgut-Produktion eingesetzt werden.	1. Laubblatt mit Stipeln und Ranke (oder 1. Ranke) entfaltet bis 2. Laubblatt mit Stipeln und Ranke (oder 2. Ranke) entfaltet																														
			Bentazon ist laut grossherzoglichem Reglement vom 09. Juli 2013 in allen Wasserschutzzonen verboten.																															
Butizyl	O 4	SC	400 gr/l MCPB	bei 10-15 cm Wuchshöhe	Erbsen	5 l/ha	-	-	-	-	-	(+)	(+)	+(+)	?	+++	++	(+)	+++	+(+)	(+)	(+)	+++	?	(+)	++	(+)	(+)	+++	(+)	++	-	x	**1 m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
				BBCH 12 - BBCH 15 (2. Laublatt bis 5. Laubblatt)	Ackerbohnen																													
Centium 36 CS	F4	CS	360 g/l Clomazone	VA	Erbsen Ackerbohnen Lupinen Sojabohnen	0,25 l/ha	-	-	+(+)	-	-	++	++	++	++	-	-	-	+(+)	+++	-	++	+	+(+)	-	-	?	?	++	+++	-	x	-	**1 m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
			Der Wirkstoff Clomazone wird hauptsächlich über Wurzeln und Spross aufgenommen und anschließend in die Blätter verlagert, daher raten wir an, die Anwendung vor BBCH 01 abzuschliessen.																															
Clomazor 360 CS	F4	CS	360 g/l Clomazone	VA	Erbsen Ackerbohnen Lupinen Sojabohnen	0,25 l/ha	-	-	-	-	-	(+)	(+)	+(+)	?	+++	++	(+)	+++	+(+)	(+)	(+)	+++	?	(+)	++	(+)	(+)	+++	(+)	++	-	x	**1 m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
			Der Wirkstoff Clomazone wird hauptsächlich über Wurzeln und Spross aufgenommen und anschließend in die Blätter verlagert, daher raten wir an, die Anwendung vor BBCH 01 abzuschliessen.																															
Challenge	F3	SC	600 g/l Aclonifen	VA (BBCH 00 - BBCH 08)	Erbsen	4 l/ha	++	-	+++	+(+)	-	+(+)	+(+)	+	+(+)	-	+(+)	+++	+++	+++	+++	+(+)	+(+)	-	+++	+++	+(+)	+	+++	+++	-	x	(x)	**10 m** bei Einsatz verlustmindernder Technik mit 75 % Abdriftminderung
Frontier Elite	K3	EC	720 g/l Dimethenamid-P	VA (BBCH 01 - BBCH 08)	Ackerbohnen	1 l/ha	+(+)	+(+)	++(+)	+	-	-	-	-	-	-	-	?	+	(+)	++	-	-	(+)	++	-	-	++(+)	-	+	-	x	-	**20m** bei Einsatz herkömmlicher Technik
				BBCH 12 - BBCH 14 (2. Laublatt bis 4. Laubblatt)	Ackerbohnen	0,5 l/ha																												
				VA (BBCH 01 - BBCH 08)	Sojabohnen	1 l/ha																												
			Unabhängig von der Kultur, darf maximal 1 kg vom Wirkstoff / ha / Jahr ausgebracht werden! Dimethenamid-P ist auch noch in Butisan Gold und Akris enthalten.																															
			In den Wasserschutzzonen III ist Dimethenamid-P nur jedes zweite Jahr erlaubt, in den Wasserschutzzonen II, gänzlich verboten.																															
			http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2013-141-fr-pdf.pdf																															
Harmony Pasture SX	B	SG	500 g/kg Thifensulfuron-methyl	BBCH 11 - BBCH 15	Sojabohnen	15 g/ha	-	-	-	-	-	?	++(+)	?	?	+(+)	?	+++	?	?	+++	++	+++	-	?	?	?	?	?	?	+(+)	-	x	**1 m**
				Erstes Laubblattpaar am ersten Nodium entfaltet bis Laubblatt am 5. Nodium entfaltet																															
Kerb 400 SC	K1	SC	400 g/l Propyzamid	VA	Sojabohnen	1,8 l/ha	++	++	+++	++	++	++(+)	++(+)	++(+)	(+)	-	?	?	-	(-)	-	-	+(+)	++(+)	+(+)	?	?	?	?	+(+)	(-)	x	-	**1 m**
Koban	K3	EC	600 g/l Pethoxamid	VA	Sojabohnen	2 l/ha	-	-	-	-	-	?	++	?	?	-	?	+++	?	?	++(+)	+	++	++	?	?	?	?	?	?	-	x	-	**20 m** bei Einsatz herkömmlicher Technik
			Max. 1200 g Pethoxamide/ha/24 Monaten																															
Propyzelco	K1	SC	400 g/l Propyzamid	VA	Sojabohnen	1,8 l/ha	++	++	+++	++	++	++(+)	++(+)	++(+)	(+)	-	?	?	-	(-)	-	-	+(+)	++(+)	+(+)	?	?	?	?	+(+)	(-)	x	-	**1 m**
Successor 600	K3	EC	600 g/l Pethoxamid	VA	Sojabohnen	2 l/ha	-	-	-	-	-	?	++	?	?	-	?	+++	?	?	++(+)	+	++	++	?	?	?	?	?	?	-	x	-	**20 m** bei Einsatz herkömmlicher Technik
			Max. 1200 g Pethoxamide/ha/24 Monaten																															
Stomp Aqua	K1	CS	455 g/l Pendimethalin	VA	Erbsen	2,5 l/ha	+(+)	-	-	-	-	(+)	++(+)	(+)	-	-	(+)	-	-	(+)	-	-	-	(+)	++	?	+	+	?	(+)	-	x	-	**20m** bei Einsatz herkömmlicher Technik
					Ackerbohnen	1,8 l/ha																												
					Lupinen	2,5 l/ha																												
					Sojabohnen	2,5 l/ha																												
			Innerhalb von 12 Monaten dürfen maximal 2000 gr/ha Pendimethalin angewendet werden (Stomp Aqua, Malibu).																															
Graminizide für eine Anwendung im Nachauflauf (Gräsermittel): Die Aufwandmenge richtet sich nach Ungrasart und dessen Entwicklungsstadium. Einjährige Rispen sollten spätestens im 3-Blatt-Stadium und Quecken bei einer Grösse von 10-15cm behandelt werden.																																		
Agil	A	EC	100 g/l Propaquiza**fop**	NA	Erbsen	bis 1,5 l/ha	+++	+++	-	++(+)	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**1 m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
Eloge	A	EC	108 g/l Haloxy**fop**-R	BBCH 13 - BBCH 19	Erbsen	0,5 l/ha	+++	+++	-	0,5 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**20m**
Abverkauf bis zum 30/06/2021				3. Laubblatt mit Stipeln und Ranke (oder 3. Ranke) entfaltet bis 9 oder mehr Laubblätter und Ranken entfaltet																															
Aufbrauchfrist der Restmenge bis zum 30/06/2022				BBCH 13 - BBCH 19	Ackerbohnen	0,5 l/ha	+++	+++	-	0,5 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**20m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
				3. Laubblatt entfaltet bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet (2 ganzrandige & 7 oder mehr gefiederte)																															
Focus Plus	A	EC	100 g/l Cycloxy**dim**	BBCH 12 - BBCH 39	Erbsen	2 - 5 l/ha	++	+++	-	++(+)	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**1 m** bei Einsatz verlustmindernder Technik mit 50% Abdriftminderung
				2. Laubblatt mit Stipeln und Ranke (oder 2. Ranke) entfaltet bis 9 und mehr sichtbar gestreckte Internodien																															
				BBCH 12 - BBCH 29	Ackerbohnen	2 - 5 l/ha	++	+++	-	++(+)	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**1 m** bei Einsatz verlustmindernder Technik mit 50% Abdriftminderung
				2. Laubblatt entfaltet bis 9 oder mehr Seitensprosse sichtbar																															
Fusilade Max	A	EC	125 g/l Fluazi**fop**	vor der Blüte	Erbsen	1 - 3 l/ha	+++	+++	-	++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**1 m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
				Es sind zwei Anwendungen jährlich erlaubt, wenn die gesamte Wirkstoffmenge 375 g/ha nicht übersteigt. bis BBCH 59 (erste Blütenblättersichtbar, Blüten noch geschlossen)																															
					Ackerbohnen	1 - 3 l/ha	+++	+++	-	++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**1 m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
				Es sind zwei Anwendungen jährlich erlaubt, wenn die gesamte Wirkstoffmenge 375 g/ha nicht übersteigt. bis BBCH 59 (erste Blütenblättersichtbar, Blüten noch geschlossen)																															
Select Prim	A	EC	120 g/l Cletho**dim**	BBCH 12 - BBCH 14	Erbsen	1 l/ha	+++	+++	++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**20 m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
				2. Laublatt mit Stipeln und Ranke (oder 2. Ranke) entfaltet bis 4. Laubblatt …																															
				BBCH 00 - BBCH 51	Ackerbohnen	1 l/ha	+++	+++	++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**20 m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
				im NA vom Ungras bis BBCH 51 der Bohnen (Erste Blütenknospen sichtbar)																															
Targa Megamax	A1	EC	50 g/l Quizalo**fop**-P	NA	Erbsen	1 - 3 l/ha	+++	++(+)	+	++(+)	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	**1 m** beim Einsatz herkömmlicher Technik
					Ackerbohnen	Das Produkt muss immer, in Mischung mit einem Paraffinöl, welches mit einem ionischen oder nicht- ionischen Benetzungsmittel versetzt ist, angewandt werden.																															

+++: sehr gute Wirkung, ++: gute Wirkung, +: Teilwirkung, -: keine Wirkung, (): nicht bewiesene Wirkung oder Wirkung mit Einschränkung, ?: keine Information vorhanden

*: Der Wert (in Meter) gibt an, welcher Mindestabstand zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer eingehalten werden muss. Angaben sind ohne Gewähr. Bitte lesen Sie die Anwendungshinweise auf dem Etikett.

1) MoA: Mode of Action (Wirkmechanismus) nach HRAC (Herbicide Resistance Action Committee)

Die Zulassung der Produkte in den jeweiligen Kulturen werden 1 - 2 x jährlich überprüft. **Ausschlaggebend und bindend sind bei der Anwendung ausschliesslich die Veröffentlichungen der A.S.T.A.**

26.04.2021

Chambre d'Agriculture, L-8001 Strassen