



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Administration des services techniques
de l'agriculture

Verantwortlech fir des Editioun sin

d'Ackerbauverwaltung (ASTA), de Lycée Technique Agricole,
d'Landwirtschaftskammer an d'Institut fir Biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg.



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Administration des services techniques
de l'agriculture



Lycée Technique
Agricole



Chambre d'Agriculture



Institut für Biologesch Landwirtschaft
an Agrarkultur Luxemburg a.s.b.l.

BESCHREIBENDE SORTENLISTE

Zum Anbau in Luxemburg empfohlene Sorten landwirtschaftlicher Nutzpflanzen



Ausgabe **2022**

Présentéiert vun der
Zortekommissioun



LËTZEBUERGER SAATGUT – EE GARANT FIR ÄREN ERFOLLEG!

RAPS

Sorte	CROME	DK EXLIBRIS	DK EXPECTATION*	DYNAMIC*	ES NAVIGO	ES VITO	LG ARCHITECT	LG AVIRON*
Züchter	NPZ	MONSANTO	MONSANTO	DSV	EURALIS	EURALIS	LIMAGRAIN	LIMAGRAIN
eingetragen	2019	2017	2021	2021	2020	2019	2019	2021
Linie/Hybride	H	H	H	H	H	H	H	H

ERTRAGSSTRUKTUR

Ölgehalt	7-8	6-7	7	8-9	6-7	6-7	7	6-7
TKG	7	7	7	6	7	6-7	7	8
Kornertrag	6-7	7-8	9	7-8	7-8	7-8	7-8	9

ANBAUEIGENSCHAFTEN

Standfestigkeit	8	7	8	7	8	8	8	8
Winterfestigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflanzenlänge	5	6	5	6	6	6	6	6
Mähdruschreife	5	5	5	6	6	5	5	5

KRANKHEITSRESISTENZ

Phoma	6	7	6	7	7	7	7	7
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)

normale Bedingungen	40	40	40	40	40	40	40	40
----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

BEMERKUNG

besondere Eigenschaft	Kohlhernie-resistent		TuYV-resistent	TuYV-resistent			TuYV-resistent	TuYV-resistent
------------------------------	----------------------	--	----------------	----------------	--	--	----------------	----------------

Legende: Phoma = Wurzelhals- und Stängelfäule - Umfallkrankheit; TuYV = Wasserrübenvergilbungsvirus;
 - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung

Ertragsaufbau bei Getreide

Beim Getreide unterscheidet man verschiedene Sortentypen. Um das Ertragspotenzial einer Sorte voll auszuschöpfen, müssen Sortentyp, Standort und Bestandesführung (Saatstärke, Düngung und Pflanzenschutz) zusammenpassen. Die ausschlaggebenden Parameter Bestandesdichte, Kornzahl pro Ähre und Tausendkornmasse bilden sich in 3 verschiedenen Entwicklungsabschnitten (siehe Grafik).

Bestandesdichte-Typen (BD) erfordern eine standortgerechte Bestandesdichte. Der Ertrag hängt von der Ährenzahl pro m² ab. Die Saatstärke muß dem Saattermin unbedingt Rechnung tragen.

1. N-Gabe bei früher Saat und gut entwickelten Beständen nicht zu hoch!
2. N-Gabe verhalten
3. N-Gabe relativ hoch!


Einzelährenertrags-Typen (EÄ) realisieren ihren Ertrag über geringe Bestandesdichten und entweder über eine hohe Tausendkornmasse (EÄ-TKM) oder eine hohe Kornzahl pro Ähre (EÄ-KZÄ). Hauptalmdominanz. Vertragen Trockenheit im Frühjahr, aber keine große Hitze bei der Abreife.

1. N-Gabe verhalten
2. N-Gabe mittelhoch und nicht zu früh
3. N-Gabe früh und hoch!

Korndichtetypen (KD) müssen eine hohe Zahl von Körnern pro m² bilden. Dies geschieht über die Kornzahl pro Ähre (KD-KZÄ) oder die Bestandesdichte (KD-BD). Sie bestocken kaum noch im Frühjahr. Vertragen Hitze und Trockenheit bei der Abreife.

1. N-Gabe verhalten
2. N-Gabe hoch!
3. N-Gabe kann entfallen!

Kompensationstypen (Komp) können zu dünne Bestände weitgehend durch eine höhere Kornzahl pro Ähre und / oder eine höhere TKM ausgleichen. Die N-Startgabe ist zu begrenzen, Schwerpunkt der N-Düngung sollte bei der 2. und 3. Gabe liegen.



① = Ährentragende Halme ② = Körner je Ähre ③ = Tausendkorngewicht

Verlauf der Ertragsbildung bei Getreide

Berechnung der Saatstärke


$$\text{Saatstärke in kg/ha} = \frac{\text{TKM} \times \text{Körner} / \text{m}^2}{\text{KFK}}$$

TKM = Tausendkornmasse (g) KFK = Keimfähigkeit (%)

Getreide

Die nebenstehende Abbildung zeigt die verschiedenen Entwicklungsstadien beim Ertragsaufbau der Getreidepflanzen.

Die Maßnahmen zur Bestandesführung können nur den gewünschten Erfolg bringen, wenn sie so gut wie möglich der Entwicklung des Bestandes angepaßt werden (siehe dazu die Anbauempfehlungen in den folgenden Tabellen).



WINTERGERSTE

Sorte	mehrzeilig				zweizeilig		
	HEDWIG	KWS HIGGINS	KWS JOYAU*	TEUTO*	CALIFORNIA	KWS MOSELLE*	LOTTIE
Züchter	V. BORRIES-ECKENDORF	KWS - LOCHOW	KWS-MOMONT	SECOBRA	LIMAGRAIN	KWS - LOCHOW	SAATZUCHT J. BREUN
eingetragen	2019	2019	2021	2021	2014	2021	2019
GMV-Resistenz	Typ 1&2	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1
GVV-Resistenz	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Qualität	FG	FG	BG	FG	FG	FG	FG
ERTRAGSSTRUKTUR							
Sortentyp	EÄ	-	BD	EÄ/Komp.	BD	BD	BD
TKG	4-5	7	4-5	6	6-7	6-7	8-9
Kornzahl/Ähre	8	6	5	7	2	2	1
Ertrag	7-8	7-8	7-8	8-9	7-8	8-9	7
ANBAUEIGENSCHAFTEN							
Standfestigkeit	6	4	4	4	6	5	7
Winterfestigkeit	-	-	-	-	-	-	-
Pflanzenlänge	6	6	5	6	4	4	4
Neigung zu Halmknicken	4	6	-	4	3	5	4
Neigung zu Ährenknicken	8	4	-	5	4	4	6
Mähdruschreife	5	5	5	6	6	5	5
KRANKHEITSRESISTENZ							
Mehltau	7	6	5	6	6	6	3
Netzflecken	6	6	7	5	6	6	6
Rhynchosporium	5	5	6	5	6	6	5
Zwergrost	5	2	5	7	6	7	6
AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)							
normale Bedingungen	300	300	300	300	350	350	350
WACHSTUMSREGLER							
normaler Bestand	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Legende: FG = Futtergerste; BG = Braugerste; GMV = GelbMosaikVirus (von Bodenpilz übertragen); GVV = GelbVerzweigungsvirus (im Herbst von Blattläusen übertragen);
- = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung

WINTERTRITICALE, WINTERROGGEN, SPELZWEIZEN, WINTERHARTWEIZEN

Sorte	WINTERTRITICALE		WINTERROGGEN		SPELZWEIZEN	WINTERHARTWEIZEN
	BREHAT	LOMBARDO	KWS SERAFINO	KWS TAYO*	ZOLLERN SPELZ	WINTERGOLD
Züchter	DESPREZ	SYNGENTA	KWS LOCHOW	KWS LOCHOW	SÜDWESTD. SAATZUCHT	SÜDWESTD. SAATZUCHT
eingetragen	2020	2020	2019	2021	2014	2014
Populationsorte /Hybride			H	H		
ERTRAGSSTRUKTUR						
TKG	6	7	6-7	7	-	7
Kornzahl/Ähre	-	-	7	7	6	5
Ertrag	7-8	8	8	8-9	8	7
ANBAUEIGENSCHAFTEN						
Standfestigkeit	5	6	4	6	6	7
Winterfestigkeit	7	8	-	-	6	6
Pflanzenlänge	7	6	5	4	5	4
Mähdruschreife	5	5	5	5	6	5
KRANKHEITSRESISTENZ						
Mehltau	8	6	7	5	6	6
Blattseptoria	-	5			5	5
Braunrost	8	3	6	6	6	5
Gelbrost	8	6			7	5
Rhynchosporium	6	7	6	6		
AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)						
günstige Bedingungen	325	325	250	250	170 kg/ha	350
WACHSTUMSREGLER						
normaler Bestand	ja	nein	ja	nein	nein	ja

Legende: - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung

WINTERWEIZEN

Sorte	BARRANCO	BERNSTEIN	KERUBINO	PONTICUS	FILON
Züchter	SECOBRA	SYNGENTA SEEDS GMBH	SAATZUCHT SCHMIDT	STRUBE, DR. HERMANN	DESPREZ
eingetragen	2017	2018	2010	2018	2020
sm1-Resistenz	nein	nein	nein	nein	ja
Qualität	E	E	E	E	A

ERTRAGSSTRUKTUR

Sortentyp	EÄ	Komp.	Komp.	Komp.	KD
TKG	8	8	7	7	5-6
Kornzahl/Ähre	5	4	3	6	6
Ertrag	7	7	7	6-7	7

ANBAUEIGENSCHAFTEN

Standfestigkeit	7	6	4	8	7
Winterfestigkeit	5	5	6	6	5
Pflanzenlänge	5	7	5	4	4
Mähdruschreife	5	5	4	5	4

KRANKHEITSRESISTENZ

Mehltau	7	5	5	8	7
Blattseptoria	5	5	5	5	7
Braunrost	6	5	5	6	7
Gelbrost	7	7	3	7	8
Ährenfusarium	6	6	6	5	6

AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)

normale Bedingungen	350	350	350	350	350
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

WACHSTUMSREGLER

normaler Bestand	nein	ja	ja	nein	nein
-------------------------	------	----	----	------	------

BEMERKUNG

Stoppelweizen	ja	ja	ja	nein	nein
----------------------	----	----	----	------	------

Legende: - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung; sm1-Resistenz = Resistenz gegenüber der orangeroten Weizengallmücke (Sitodiplosis mosellana) - Larven zerstören Kornanlage in den Ähren

WINTERWEIZEN

Sorte	PIONIER	RGT REFORM	CAMPESINO	COLONIA	INFORMER	KWS KEITUM*	SAFARI
Züchter	DSV	RAGT	SECOBRA	ACKERMANN	„SAATZUCHT JOSEF BREUN“	KWS	SYNGENTA
eingetragen	2015	2018	2019	2015	2020	2021	2020
sm1-Resistenz	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Qualität	A	A	B	B	B	C	C

ERTRAGSSTRUKTUR

Sortentyp	Komp.	BD/Komp.	Komp.	EÄ/KZÄ	EÄ	EÄ	Komp.
TKG	5-6	7	5-6	6	8	8	6-7
Kornzahl/Ähre	6	5	7	6	6	5	6
Ertrag	7-8	7-8	8-9	7-8	7-8	8-9	8

ANBAUEIGENSCHAFTEN

Standfestigkeit	7	6	6	6	6	4	7
Winterfestigkeit	5	6	6	5	-	-	-
Pflanzenlänge	5	3	4	4	5	5	4
Mähdruschreife	6	5	5	5	6	6	6

KRANKHEITSRESISTENZ

Mehltau	7	7	8	6	8	9	7
Blattseptoria	5	6	6	6	7	6	7
Braunrost	4	7	8	5	6	6	8
Gelbrost	6	6	7	7	9	8	7
Ährenfusarium	5	6	5	6	5	6	5

AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)

normale Bedingungen	350	350	350	350	350	350	350
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WACHSTUMSREGLER

normaler Bestand	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein
-------------------------	------	------	------	------	------	----	------

BEMERKUNG

Stoppelweizen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
----------------------	----	----	----	----	----	----	------

Legende: - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung; sm1-Resistenz = Resistenz gegenüber der orangeroten Weizengallmücke (Sitodiplosis mosellana) - Larven zerstören Kornanlage in den Ähren

SOMMERGERSTE

Sorte	GREENWAY	KLARINETTE	LAUREATE
Züchter	NORDIC SEED	SECOBRA	SYNGENTA
eingetragen	2020	2019	2019
Qualität	bf	FG	BG
ERTRAGSSTRUKTUR			
TKG	6-7	7	6-7
Ertrag	7-8	7-8	8
ANBAUEIGENSCHAFTEN			
Standfestigkeit	6	6	5
Pflanzenlänge	3	3	3
Neigung zu Halmknicken	6	4	4
Neigung zu Ährenknicken	5	5	4
Mähdruschreife	6	5	6
KRANKHEITSRESISTENZ			
Mehltau	8	7	8
Netzflecken	7	7	6
Rhynchosporium	7	6	6
Zwergrost	5	7	6
AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)			
normale Bedingungen	325	325	325
WACHSTUMSREGLER			
normaler Bestand	nein	nein	nein

Legende: FG = Futtergerste; BG = Braugerste; bf = braufähig; - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung

SOMMERHAFER

YUKON
SAATEN-UNION NORDSAAT
2019
gelb
7
6-7
6
5
5
9
350
nein

SOMMERWEIZEN

Sorte	KWS MISTRAL	KWS SHARKI	PUZON	(ASTRONAUTE)	(FANFARE)
Züchter	KWS	KWS	DANKO	NPZ	NPZ
eingetragen	2018	2019	2019	2015	2015
Qualität	A	E			
ERTRAGSSTRUKTUR					
TKG	7	8	7	6	6
Kornzahl/Ähre	6	3	-	-	-
Ertrag	8	7	6-7	9	7
ANBAUEIGENSCHAFTEN					
Standfestigkeit	5	5	6	8	8
Pflanzenlänge	5	5	5	8	6
Mähdruschreife	5	5	5	4	5
KRANKHEITSRESISTENZ					
Mehltau	6	5	7-8		
Blattseptoria	4	6	7		
Braunrost	5	5	8		
Gelbrost	5	6	8		
Ährenfusarium	5	5	7-8		
AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)					
günstige Bedingungen	400	400	350	80	35
WACHSTUMSREGLER					
normaler Bestand	ja	ja	nein		
BEMERKUNG					
Rohproteingehalt	-	-	-	6	4

Legende: - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung; (Astronaut/Fanfare) = 2019/2018 zuletzt geprüft

ERBSEN

SILOMAIS

Sorte	Sehr frühe Sorten					
	*AMAIZI	SY NORDICSTAR	LG 31205	SY KARTHOUN	*JAKLEEN	SY AMBOSS
Züchter	CAUSSADE	SYNGENTA	LIMAGRAIN	SYNGENTA	LIMAGRAIN	SYNGENTA
Eintragung	2021	2018	2020	2017	2021	2018
Typ	EH	EH	EH	EH	EH	EH
Reifezahl	180	180	200	200	210	210
Trockenmasseertrag	7	6	8	7	9	8
TS-Gehalt (ganze Pflanze)	8	8	7	7	8	8
TS-Gehalt (Kolben)	8	8	8	8	7	8
Energiedichte VEM	8	7	8	7	8	7
Kolbenanteil	8	8	9	8	9	7
Stärkeanteil	9	8	8	7	9	7
Verdaulichkeit	9	7	8	7	8	8
Kältetoleranz in der Jugend	8	8	8	8	8	8
Saatstärke Körner/ha	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bemerkung	Nur im Oesling geprüft, und nur für diesen Standort empfohlen	Nur im Oesling geprüft, und nur für diesen Standort empfohlen	Nur im Oesling geprüft, und nur für diesen Standort empfohlen			

Benutzte Abkürzungen: Typ: EH= Einfachhybride; DH= Doppelhybride; DWH= Dreiweghybride; * = Neueintragung

SILOMAIS

Sorte	Frühe und mittelfrühe Sorten				
	MANTILLA	MILKSTAR	RANCADOR	RGT OXXFORD	SY SKANDIK
Züchter	LIMAGRAIN	LIMAGRAIN	KWS	RAGT	SYNGENTA
Eintragung	2020	2017	2020	2020	2019
Typ	EH	EH	DWH	EH	EH
Reifezahl	220	220	220	220	220
Trockenmasseertrag	7	9	8	8	8
TS-Gehalt (ganze Pflanze)	8	7	9	8	7
TS-Gehalt (Kolben)	9	7	8	8	9
Energiedichte VEM	7	7	8	7	8
Kolbenanteil	8	6	8	8	8
Stärkeanteil	9	7	9	8	8
Verdaulichkeit	8	8	8	8	9
Kältetoleranz in der Jugend	7	7	8	8	7
Saatstärke Körner/ha	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Benutzte Abkürzungen: Typ: EH= Einfachhybride; DH= Doppelhybride; DWH= Dreiweghybride; * = Neueintragung

Sorte	Mittelspäte und späte Sorten						
	CHARLEEN	ES WATSON	FIGARO	LG31276	P8171	SY TELIAS	P8333
Züchter	LIMAGRAIN	EURALIS	KWS	LIMAGRAIN	PIONEER	SYNGENTA	PIONEER
Eintragung	2020	2019	2017	2020	2019	2019	2018
Typ	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH
Reifezahl	240	240	240	240	240	240	250
Trockenmasseertrag	9	8	7	9	7	8	8
TS-Gehalt (ganze Pflanze)	9	7	8	9	7	7	7
TS-Gehalt (Kolben)	7	7	8	7	8	7	7
Energiedichte VEM	8	8	8	8	8	9	8
Kolbenanteil	7	6	8	8	8	9	7
Stärkeanteil	8	6	7	7	9	9	7
Verdaulichkeit	7	7	7	7	7	8	7
Kältetoleranz in der Jugend	8	8	8	8	8	8	8
Saatstärke Körner/ha	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000

Benutzte Abkürzungen: Typ: EH= Einfachhybride; DH= Doppelhybride; DWH= Dreiweghybride; * = Neueintragung

Wichtige Anbautipps

Bodenansprüche:

Lehmige, humose Sandböden bis sandige Lehmböden, steinfrei, pH=5.5-6.5, keine Kalkung vor dem Kartoffelanbau.

Fruchtfolge:

alle 4-5 Jahre, günstige Vorfrüchte sind Stoppelfrüchte und Getreide.

Düngung:

Ertragserwartung 350 dt/ha (Stufe C im Boden)	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Mittelfrühe Speisekartoffel	100-140-170*	102	245

* : maximale N-Dosis laut Entzugswerten RGD 26.08.2016

Pflanzgutproduktion

sowie Früh- und Speisekartoffel mit hohem Qualitätsanspruch:

Verhaltens N-Gaben bis max 100kg N/ha.

Organische Düngung:

Stallmist, Herbstgabe.

Kaliumversorgung:

Einfluß auf Ertrag, Lagerung, Verfärbungen der Knollen, Beschädigungsempfindlichkeit, Kochtyp (TS-Gehalt), nur chloridfreie resp. chloridarme Dünger verwenden.

Pflanzung:

Mitte April bis Mitte Mai (ab 8°C Bodentemperatur).

Pflanzgutvorbereitung:

Verwendung ausschließlich von anerkanntem zertifiziertem Pflanzgut (blaue Etikette) gemäss luxemburgischer Reglementierung bei keimträgen Sorten, Pflanzguterzeugung, Frühkartoffeln, Gartenanbau und auf trockenen Standorten.

Vorkeimen:

Bildung von 1-2 cm langen, kräftigen Keimen durch:

- Lagerung bei 10-12°C, hell, 80-85% Luftfeuchtigkeit, 3-4 Wochen
- anfänglicher Temperaturstoß von 15-20°C während 24-48 Stunden
- Vorkeimkisten (nicht mehr als 3 Lagen Knollen)
- Abhärtung durch Lichteinfluß (Beleuchtung, tagsüber im Freien)

Keimstimmung:

Keimlinge von 2-3mm lang.

Lagerung bei Temperaturen zwischen 12-15°C in üblichen Behältern während 14-21 Tagen, unbedingt bei keimträgen Sorten im Speisekartoffelanbau (wie Annalena, Anuschka, Belana, Jelly) und Pflanzgut.

Wärmestoß:

Von 25-30°C während 48 Stunden bei Zeitmangel und keimträgen Sorten.

Reihenweite und Legeabstand:

- Speisekartoffelbau: 75 x 35-45 cm
- Festkochende Sorten: 75 x 32-38 cm (für mittelkalibrige Ware)
- Gartenanbau: 3-4 Knollen/m²

Pflanzgutkaliber (mm):

Sortierung von 28/35 (für Grosskaliber), 35/45 (für Mittelkaliber).

Legetiefe:

4-5cm tief, spätere Dammbildung mit 10-15 cm Boden über den Knollen.

SPEISEKARTOFFEL

Sorte	Sehr frühe bis frühe Sorten							
	ANNABELLE	GLORIETTA	CORINE	ANUSCHKA	UKAMA	BELANA	RED SCARLETT	IVETTA
Züchter	HZPC	BÖHM NORD KARTOFFEL AGRARPRODUKTION	CEBECO	KARTOFFEL-ZUCHT BÖHM	FRIESE	EUROPLANT	HZPC	BÖHM NORD KARTOFFEL AGRARPRODUKTION
Eintragung	2010	2012	1972	2015	1983	2008	2001	2019
KNOLLENEIGENSCHAFTEN								
Knollenform	LO	LO	R-O	R-O	O	LO-O	R-O	O
Kaliber	5	5-6	6-7	7	6-7	5	6-7	5
Schalensfarbe	G	G	G	G	G	G	R	HG-G
Schale	glatt	glatt	gl-rau	gl-genetzt	glatt	gl-rau	gl-rau	gl-genetzt
Stoßanfälligkeit	5	4-5	3	5	5	5	5	5
Wachstumsstörungen	3	3	5	3	5	3	3	7
Lagerfähigkeit	2	6-7	3	6	3	6-7	5	7
ANBAUEIGENSCHAFTEN								
Reifetyp	sfr.	sfr-fr	fr	fr	fr	fr	fr	fr
Ansatzzeit	sfr.	sf-fr	sfr-fr	fr	sfr-fr	fr	sfr	fr
Knollenzahl	6	6-7	5	6	6	7	5	6
Ertrag	5-6	6	4-5	7	6	7-8	6-7	7
KRANKHEITSANFÄLLIGKEIT								
Krautfäulnis	5	5	3	5	6	3	3	5
Knollenfäulnis	5	3	3	4	3	3	5	-
G.Schorf	4	3	5	4	6	5	3	3
Alternaria	3	/	3	5	6	3	3	-
Rhizoctonia Beizung	erforderlich	erforderlich		erforderlich		erforderlich		
Keimung (Keimstimmung erforderlich)	keimfreudig	Temperaturstoß	-	keimträge	-	keimträge	-	keimträge
SPEISE- UND VEREDLUNGSEIGENSCHAFTEN								
Fleischfarbe	HG	G	WG	HG	HG	HG	WG	G
Eisenfleckigkeit	2	3	4	5	4	4	2	2
Nachdunklung	2	3	4	3	3	4	3	3
Kochtyp	BA-B	AB-BA	B	BA-B	BC	BA-B	B-BC	B
Fritiereigenschaft	1	1	7	2	4	1	8	2
BEMERKUNG								
	früh abreifende feine Salatkartoffel	wohlschmeckende gelbfleischige Salatkartoffel, homogener Marktertrag	frühe Fritiersorte	glatte, gelbfleischige Salatkartoffel mit hohem Marktwarenenertrag	vielseitige Speisekartoffel	wohlschmeckende formschöne Salatspeise-Kartoffel	hervorragende Fritiersorte, trockenheitsempfindlich	Ausschließlich: Nematodenresistente Speisesorten für nematodenbefallene Standorte

SPEISEKARTOFFEL

Sorte	Mittelfrühe Sorten						
	BINTJE	VICTORIA	JELLY	MONALISA	LUMINELLA	LAURA	DÉSIRÉE
Züchter	DE VRIES	HZPC	EUROPLANT	VAN DER ZEE, DE ZPC	SYNPLANTS	KARTOFFELZUCHT BÖHM GMBH	HZPC
Eintragung	vor 1947	2000	2002	2007	2009	2018	1960
KNOLLENEIGENSCHAFTEN							
Knollenform	O	LO-O	O	O	O	O	O
Kaliber	5-6	6-7	7	7	6-7	5-6	6-7
Schalensfarbe	G	G	G	G	R	R	R
Schale	gl-rau	gl-rau	glatt-rau	glatt	rau	glatt	gl-rau
Stoßanfälligkeit	5	5	5	5	3	4	4
Wachstumsstörungen	7	5	3	2	5	2	5
Lagerfähigkeit	4	7	6-7	7	6	6	5
ANBAUEIGENSCHAFTEN							
Reifetyp	mfr	mfr	mfr-msp	mfr	mfr	mfr	mfr-msp
Ansatzzeit	mr	mfr	fr-mfr	fr-mfr	mfr	mfr	mfr-fr
Knollenzahl	5	4	6	6	5	5	5
Ertrag	6	7	7	5-6	6-7	6-7	7
KRANKHEITSANFÄLLIGKEIT							
Krautfäulnis	7	5	5-6	7	5	5	5
Knollenfäulnis	7	5	3	7	-	3	3
G.Schorf	7	4	3	6	6	3	8
Alternaria	3	3	3	6	4	4	3
Rhizoctonia Beizung			erforderlich			erforderlich	
Keimung (Keimstimmung erforderlich)	-	api. Dominanz	Keimstimmung	keimträge	-	-	-
SPEISE- UND VEREDLUNGSEIGENSCHAFTEN							
Fleischfarbe	WG	HG	G	WG-HG	WG-HG	glatt	WG-HG
Eisenfleckigkeit	2	4	3	5	4	5	4
Nachdunklung	3	4	4	4	4	4	4
Kochtyp	BC-CB	B	B	B-BC	CB	BA-B	BC
Fritiereigenschaft	7	8	7	3	6	7	8
BEMERKUNG							
	alle Verwendungsmöglichkeiten	exzellente Fritiersorte, trockenheitsempfindlich	formstabile, schmackhafte, gelbfleischige Veredlungsorte mit Trockenheistresistenz (Naßfäule)	Verarbeitungssortensorte, formschöne, homogene Speisesorte	Veredlungsorte	formtreue, glattschalige Speise- und Verarbeitungsorte mit angenehmen Geschmack	alle Verwendungsmöglichkeiten

SPEISEKARTOFFEL

Sorte	Festkochend-Vorw. Festkochende mittelfrühe Sorten						
	NICOLA	ANNALENA	EMANUELLE	CHARLOTTE	HEIDIENIERE	LINDA	HANSA
Züchter	SOLTAU-BERGEN	BÖHM NORDKARTOFFEL AGRARPRODUKTION	HZPC IPR BV	UNICOPA	KARSTEN ELLENBERG	KARSTEN ELLENBERG	VEREINIGTE SAATZUCHTEN EBSTORF-ROSCHKE
Eintragung	1991	2012	2020	1988	2019	2021	2013
KNOLLENEIGENSCHAFTEN							
Knollenform	LO	LO	O-LO	LO	L	O	LO
Kaliber	5	6	5	5	4-5	6	4-5
Schalenfarbe	G	G	G	G	G-O	G-O	DG
Schale	gl-rau	glatt	glatt	glatt	rau	rau	gl-rau
Stoßanfälligkeit	5	5	4	7	5	5	3
Wachstumsstörungen	2	3	3	4	7	7	4
Lagerfähigkeit	4	6-7	5	5	5	4-5	7
ANBAUEIGENSCHAFTEN							
Reifetyp	mfr	mfr	mfr	fr-mfr	fr-mfr	mfr	mfr-msp
Ansatzzeit	mfr	mfr	mfr	fr	fr-mfr	mfr	mfr
Knollenzahl	7	7	6	6	6-7	6	7
Ertrag	5-6	7	7	6	6	6-7	6-7
KRANKHEITSANFÄLLIGKEIT							
Krautfäulnis	5	5-6	5	6	6	5	6
Knollenfäulnis	7	4	3	8	3	3	5
G.Schorf	3	3	3	6	5	3	3
Alternaria	3	/	/	4	-	-	4
Rhizoctonia Beizung		erforderlich	erforderlich		erforderlich	erforderlich	
Keimung	-	Keimstimmung	Keimstimmung	-	Keimstimmung	Keimstimmung	keimträge
SPEISE- UND VEREDLUNGSEIGENSCHAFTEN							
Fleischfarbe	HG	G	G	HG	WG-HG	HG	HG
Yntn Knollentoleranz	1	8	8	8	8	3	5
Nachdunklung	4	3	4	2	2	2	3
Kochtyp	B-BA	BA-B	BA-B	B*	B-BC	BA-B	B-BC
Fritiereigenschaft	1	1	1	4	-	3	4
BEMERKUNG							
	wohlschmeckende, festkochende Speisesorte	„ertragreiche, schöne Speisesorte mit gutem Geschmack, low-Input Sorte (geringerer N-Bedarf)“	robuste festkochende schmackhafte Qualitätssorte	wohlschmeckend, heterogene Speisqualität			lagerfähige Speisekartoffel

Erklärungen:

Ertrag, Knollenzahl, Lagerfähigkeit:

1=sehr niedrig, 3=niedrig, 5=mittel, 7=hoch, 9=sehr hoch.

Anfälligkeit für Krankheiten, Eisenfleckigkeit, Beschädigungen, Wachstumsstörungen (Zwiewuchs, Risse, Hohlherzigkeit), Nachdunklung:

1=sehr gering, 3=gering, 5=mittel, 7=stark, 9=sehr stark.

Fritiereigenschaften:

1=ungeeignet, 3=gering, 5=mittel, 7=hoch, 9=sehr hoch.

Farbe:

R=rot, G=gelb, HG= hellgelb, WG=weiss-gelblich, DG= Dunkelgelb, TG= Tiefgelb


Form:

lo=langoval, o=oval, ro=rundoval, r=rund.

*: Kochtyp stark durch Witterung geprägt, UWG-Kontrollen erforderlich

Angaben basierend auf den Versuchsergebnissen aus den Sortenversuchen in Bettendorf, Binsfeld und Altrief.

Auswahl nach Sorteneigenschaften



ENGLISCHES RAYGRAS

Sorte	Frühe Sorten						
	ALGIRA	ARCTURUS	ARTONIS	ARVICOLA	MARAVA	SALAMANDRA	SALMO
Züchter	AGROSCOPE / DSV	AGROSCOPE	AGROSCOPE	AGROSCOPE / FREUDENB.	RUDLOFF	AGROSCOPE	AGROSCOPE / FREUDENB.
eingetragen	2017	2017	2021	2012	2021	2007	2016
Ploidietyp	T	T	T	T	D	T	T
Nutzungstyp	M	M	M	M	MW	MW	MW
Austrieb	6	5	6	5	5	5	5
Winterhärte	5	6	5	5	5	6	6
Ährenschieben	3	2	3	3	4	3	4
Narbendichte	6	5	5	5	5	5	5
Gesamtertrag	5	7	7	5	6	6	6
Ertrag 1. Schnitt	6	7	5	5	6	7	7
Weitere Schnitte	5	6	7	5	6	5	6
Trockenheitsresistenz	6	6	6	5	5	6	6
Krankheitsresistenz	6	6	7	6	6	6	6
Nutzungsflexibilität	5	6	6	6	7	6	6
Ausdauer	7	7	7	6	7	7	7

Benutzte Abkürzungen: Ploidietyp: D= Diploid; T= Tetraploid

Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung; W = Weidenutzung

ENGLISCHES RAYGRAS

Sorte	Mittelfrühe - Mittelspäte Sorten						
	ACTIVA	ALLIGATOR	ALLODIA	BARCAMPO	CANTALOU	ELIXIR	EURO-CONQUEST
Züchter	SEMENCES DE FRANCE	AGROSCOPE / DSV	AGROSCOPE / RUDLOFF	BARENBRUG	RAGT / CARNEAU	JOUFFRAY DR.	DSV
eingetragen	2018	2007	2016	2016	2012	2021	2021
Ploidietyp	T	T	T	T	T	T	T
Nutzungstyp	MW	MW	MW	MW	MW	W	MW
Austrieb	4	4	4	5	6	6	6
Winterhärte	6	6	5	5	6	5	7
Ährenschieben	4	5	5	6	5	6	5
Narbendichte	6	5	5	6	6	5	5
Gesamtertrag	6	7	6	5	7	6	7
Ertrag 1. Schnitt	7	6	6	6	7	6	7
Weitere Schnitte	5	6	5	5	6	5	5
Trockenheitsresistenz	5	6	7	6	6	5	6
Krankheitsresistenz	7	5	6	6	5	6	5
Nutzungsflexibilität	5	5	6	7	7	7	7
Ausdauer	6	6	6	6	5	6	6

Benutzte Abkürzungen: Ploidietyp: D= Diploid; T= Tetraploid

Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung; W = Weidenutzung



ENGLISCHES RAYGRAS

Sorte	Mittelfrühe – Mittelspäte Sorten				
	MAGNIFICAT	MASSIMO	MERCEDES	SORONIA	TRIVOS
Züchter	JOUFFRAY DR.	DLF SEEDS	STEINACH	AGROSCOPE	DSV
eingetragen	2021	2016	2012	2021	2012
Ploidietyp	D	D	T	T	T
Nutzungstyp	W	W	W	M	MW
Austrieb	6	5	6	6	5
Winterhärte	6	6	6	6	6
Ährenschieben	6	6	7	5	5
Narbendichte	6	7	6	6	6
Gesamtertrag	6	7	5	6	7
Ertrag 1. Schnitt	6	7	6	7	7
Weitere Schnitte	6	6	5	5	6
Trockenheitsresist.	6	6	5	7	6
Krankheitsresist.	7	6	6	7	5
Nutzungsflexibilität	7	6	7	6	7
Ausdauer	6	7	5	6	7

Benutzte Abkürzungen: Ploidietyp: D= Diploid; T= Tetraploid

Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung; W = Weidenutzung

ENGLISCHES RAYGRAS

Sorte	Späte Sorten										
	ALCAZAR	DELIKA	HURRICANE	KAIMAN	KENTAUR	MELWAYS	POLIM	SEVERIN	SPUTNIK	TODDINGTON	VALERIO
Züchter	SEMENCES DE FRANCE	JOUFFRAY DR.	CARNEAU / DSV	DSV	DLF SEEDS	BARENBRUG / ILVO	DLF SEEDS	SAATZUCHT STEINACH	DLF SEEDS	DLF SEEDS	DSV
eingetragen	2021	2021	2016	2021	2011	2012	2012	2021	2021	2016	2021
Ploidietyp	T	D	T	D	T	D	T	T	D	D	T
Nutzungstyp	MW	W	W	MW	W	W	W	MW	MW	MW	MW
Austrieb	7	7	6	6	6	6	6	6	7	6	6
Winterhärte	6	6	6	6	6	6	7	7	6	7	6
Ährenschieben	8	8	7	7	7	7	7	8	6	7	7
Narbendichte	7	7	7	6	6	6	6	5-6	6	6	5
Gesamtertrag	6	6	8	7	6	6	6	8	8	6	8
Ertrag 1. Schnitt	5	5	7	6	7	5	6	7	7	6	8
Weitere Schnitte	6	6	7	7	5	7	7	7	7	6	6
Trockenheitsresist.	5	6	6	5	5	5	7	7	7	5	6
Krankheitsresist.	6	7	6	6	6	5	6	6	7	5	5
Nutzungsflexibilität	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	7
Ausdauer	6	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6

Benutzte Abkürzungen: Ploidietyp: D= Diploid; T= Tetraploid

Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung; W = Weidenutzung

TIMOTHEE (WIESENLIESCHGRAS)

Sorte	Heutypen, ausschließlich für Mähnutzung			
	BARFLEO	DOLINA	LISCHKA	RASANT
Züchter	BARENBRUG	DLF SEEDS / ILVO	DSV	FREUDENBERGER
eingetragen	2003	2003	2004	1984
Nutzungstyp	M	M	M	M
Austrieb	6	4	5	4
Winterhärte	7	7	7	7
Ährenschieben	5	4	5	4
Narbendichte	7	6	5	5
Gesamtertrag	6	7	6	8
Ertrag 1. Schnitt	8	5	5	7
Weitere Schnitte	4	5	5	3
Trockenheitsresistenz	5	6	6	5
Ausdauer	7	7	6	7

Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung; W = Weidenutzung

TIMOTHEE (WIESENLIESCHGRAS)

Sorte	Zwischentypen, sowohl für Mäh- als auch Weidenutzung					
	BARPENTA	CLASSIC	COMTAL	ERECTA	PRESTO	PROMESSE
Züchter	BARENBRUG	DLF / INNO SEEDS	DLF SEEDS	DVP / ILVO	DSV / ZELDER	DLF SEEDS
eingetragen	2003	2003	2004	1974	2005	2004
Nutzungstyp	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Austrieb	6	6	5	4	4	5
Winterhärte	7	6	7	6	6	6
Ährenschieben	7	7	6	6	5	6
Narbendichte	7	5	5	6	6	7
Gesamtertrag	6	7	6	6	6	6
Ertrag 1. Schnitt	5	6	6	6	6	5
Weitere Schnitte	6	5	5	4	5	5
Trockenheitsresistenz	4	6	5	6	5	6
Ausdauer	6	7	6	6	6	6

Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung; W = Weidenutzung

WIESENSCHWINGEL


Sorte	BARVITAL	COSIMA	COSMOLIT	LIHEROLD	PARDUS	PRADEL	PREVAL
Züchter	BARENBRUG	SAATZ. STEINACH	SAATZ. STEINACH	DSV	AGROSCOPE / FREUDENB.	BARENBRUG / AGROSCOPE	AGROSCOPE / DSV
eingetragen	2004	2012	2003	2012	2011	2003	2003
Nutzungstyp	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Austrieb	5	5	6	5	6	6	7
Winterhärte	6	6	6	7	6	7	7
Ährenschieben	5	4	4	5	4	3	6
Narbendichte	7	6	6	6	5	6	5
Gesamtertrag	6	6	7	6	8	6	7
Ertrag 1. Schnitt	5	6	7	6	6	5	5
Weitere Schnitte	6	5	4	5	6	7	6
Trockenheitsresistenz	6	5	5	6	5	6	6
Krankheitsresistenz	6	6	6	7	6	6	7
Ausdauer	7	7	7	6	7	6	7

Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung

KNAULGRAS

Sorte	BARAULA	INTENSIV	LIDACTA
Züchter	BARENBRUG	BARENBRUG	DSV
eingetragen	1974	2004	2003
Nutzungstyp	MW	MW	MW
Austrieb	7	6	5
Winterhärte	6	7	6
Ährenschieben	8	6	6
Narbendichte	6	6	6
Gesamtertrag	6	6	6
Ertrag 1. Schnitt	5	5	5
Weitere Schnitte	6	5	6
Trockenheitsresistenz	6	6	4
Krankheitsresistenz	6	5	6
Nutzungsflexibilität	6	6	6
Ausdauer	5	7	5

Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung



ITALIENISCHES RAYGRAS (tetraploid)

Sorte	BARMULTRA II	DANERGO	ZEBU	ZORRO
Züchter	BARENBRUG	DLF SEEDS	AGROSCOPE / FREUNDENBERGER	DLF SEEDS
eingetragen	2012	1995	2012	1998
Ploidietyp	T	T	T	T
Austrieb	4	3	6	4
Winterhärte	7	7	6	8
Ährenschieben	5	5	5	5
Gesamtertrag	7	7	8	8
Ertrag 1. Schnitt	6	7	7	5
Weitere Schnitte	6	6	6	6
Trockenheitsresistenz	6	6	6	4
Krankheitsresistenz	7	7	6	7
Nutzungsflexibilität	6	6	6	5
Aussaatstärke kg/ha	35-40	35-40	35-40	35-40

Benutzte Abkürzungen: Ploidietyp: D= Diploid; T= Tetraploid

ITALIENISCHES RAYGRAS (diploid)

Sorte	LASCAR	MERIBEL	ORYX
Züchter	SEMENCES DE FRANCE/RAGT	DVP / ILVO	AGROSCOPE/ FREUNDENBERGER
eingetragen	2012	1999	2003
Ploidietyp	D	D	D
Austrieb	5	5	4
Winterhärte	6	7	6
Ährenschieben	5	5	6
Gesamtertrag	6	5	8
Ertrag 1. Schnitt	7	5	7
Weitere Schnitte	5	7	7
Trockenheitsresistenz	5	5	6
Krankheitsresistenz	6	6	6
Nutzungsflexibilität	6	5	5
Aussaatstärke kg/ha	30-35	30-35	30-35

Benutzte Abkürzungen: Ploidietyp: D= Diploid; T= Tetraploid



WESTERWOLDISCHES RAYGRAS

Sorte	BARTIGRA	CAREXPRESS	LIQUATTRO	LOLAN	SUXYL
Züchter	BARENBRUG	SEMENCES DE FRANCE	DSV	DLF SEEDS	RAGT R2N
eingetragen	2012	2012	1998	2012	2012
Ploidietyp	T	D	T	T	D
Nutzungstyp	M	M	M	M	M
Anfangsentwicklung	5	6	7	6	4
Ährenschieben	6	5	4	6	5
Narbendichte	4	5	5	4	6
Gesamtertrag	6	7	6	6	8
Ertrag 1. Schnitt	6	6	8	6	7
Weitere Schnitte	6	7	4	5	5
Krankheitsresistenz	5	5	7	6	6
Nutzungsflexibilität	5	6	5	5	5
Aussaatzstärke	30-35	30-35	30-35	30-35	30-35
Bemerkung	-	-	einschnittig	-	-

Benutzte Abkürzungen:

Ploidietyp: D= Diploid; T= Tetraploid

Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung; W = Weidenutzung

HYBRID RAYGRAS

Sorte	IBEX	MELAURIS	PERENEIA	PIROL
Züchter	DSV	ILVO	AGROSCOPE	SAATZ.STEINACH
eingetragen	2007	2021	2021	2007
Ploidietyp	T	T	T	D
Nutzungstyp	M	MW	MW	MW
Wuchstyp	IR	IR	ER	ER
Anfangsentwicklung	6	7	6	5
Ährenschieben	6	6	6	6
Narbendichte	5	6	7	5
Gesamtertrag	5	7	7	6
Ertrag 1ter Schnitt	6	7	7	6
Weitere Schnitte	6	7	7	7
Krankheitsresistenz	6	7	6	5
Nutzungsflexibilität	6	7	6	5
Aussaatzstärke	28-30	30	28-30	28-30
Bemerkung	-	-	-	-

IR = Italienisches Raygras

ER = Englisches Raygras

WIESENRISE

Sorte	LATO	LIMAGIE
Züchter	SAATZ. STEINACH	DSV
eingetragen	2001	2001
Nutzungstyp	M/MW	MW
Winterhärte	8	6
Rispenschieben	7	6
Narbendichte	5	6
Gesamtertrag	6	8
Ertrag 1. Schnitt	6	5
Weitere Schnitte	6	6
Krankheitsresistenz	6	7
Ausdauer	5	5

Benutzte Abkürzungen:
Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung; W = Weidenutzung

WIESENSCHWEIDEL

Sorte	FEDORO	PERUN
Züchter	DSV	BARENBRUG / DLF
eingetragen	2021	2021
Ploidietyp	T	T
Nutzungstyp	MW	MW
Winterhärte	6	6
Anfangsentwicklung	5	7
Rispenschieben	7	6
Narbendichte	4	5-6
Gesamtertrag	6	7
Ertrag 1. Schnitt	7	7
Weitere Schnitte	6	7
Krankheitsresistenz	6	5
Ausdauer	5	5

Benutzte Abkürzungen:
Nutzungstyp: M = Mähnutzung; MW = Mähweidenutzung; W = Weidenutzung

WEISSKLEE

Sorte	CALIMERO	MERIDA	MERLYN	MUNIDA	MERWI	SILVESTER	VIOLIN	VYSOCAN
Züchter	BARENBRUG	SEMENCES DE FRANCE/ DVP	FREUDENBERGER/ILVO	AGROSCOPE/ DSV	ILVO	DLF SEEDS	DLF SEEDS	AGROGEN/ DSV
eingetragen	2016	2007	2016	2018	1998	2018	2018	2016
Blatttyp	GB/MB	MB	GB/MB	GB/MB	MB	GB/MB	MB	MB
Austrieb	6	5	6	6	5	5	6	5
Winterhärte	6	6	5	4	6	6	5	7
Narbendichte	7	5	6	5	5	5	4	5
Gesamtertrag	7	7	6	5	6	7	5	7
Ertrag 1. Schnitt	6	5	5	6	6	6	4	5
Weitere Schnitte	5	5	6	6	6	6	7	6
Krankheitsresistenz	7	6	6	7	6	6	7	5
Ausdauer	6-7	7	6	6	6	6	5-6	6-7

Benutzte Abkürzungen: Blatttyp MB= Mittelblättrig; GB= Großblättrig
Bedeutung der Noten 1 bis 9;

ROTKLEE

Sorte	DIPLOMAT	LARUS	MARO	SPURT
Züchter	DSV (NL)	AGROSCOPE / DSV	DSV (NL)	BARENBRUG
eingetragen	2007	2007	2007	2021
Ploidietyp	D	T	T	D
Austrieb	4	5	4	5
Winterhärte	6	8	7	7
Gesamtertrag	8	8	7	8
Blattanteil	5	6	5	6
Krankheitsresistenz	6	6	7	7

LUZERNE

Sorte	FÉLICIA	FLEETWOOD	GALAXIE	LUZELLE	MILKY-MAX	EUROPE
Züchter	DSV/JOUFFRAY-DRILLAUD	DSV / SAATZ. STEINACH	JOUFFRAY-DRILLAUD	INRA / JOUFFRAY-DRILLAUD	JOUFFRAY-DRILLAUD	DLF SEEDS
eingetragen	2018	2019	2018	2001	2019	1974
Austrieb	5	5	5	6	5	4
Gesamtertrag	8	6-7	7	6	7-8	7
Krankheitsresistenz	6	6	6	5	6	6
Grobstängeligkeit	6	5	5	5	5	3
Ausdauer	5	5	5	5	7	6
Bemerkung	-	-	-	weideeignung	-	-

Benutzte Abkürzungen: Ploidietyp: D= Diploid; T= Tetraploid

Bedeutung der Noten 1 bis 9:

1=sehr früh;sehr schlecht;sehr gering;grobstängelig; 9=sehr spät;sehr gut;sehr hoch; feinstängelig

Qualitäts-Grünlandmischungen

Um zu vermeiden, daß der Gras- und Kleesamenhandel sich auf das niedrigste Qualitätsniveau einpendelt, wurde behördlicherseits ein Qualitätsetikett für Grünlandmischungen eingeführt, das sogenannte „Orangefarbene Etikett“.

Dieses Qualitätslabel wird nur auf den Grünlandmischungen angebracht, die sich ausschließlich aus Saatgut von Sorten der „empfehlenden Sortenliste“ zusammensetzen, d.h. von Sorten, die in unserem Land offiziell geprüft wurden und sich bewährt haben.


Diese, mit dem „orangefarbenen Etikett“ versehenen Grünlandmischungen sind unter Umständen teurer, bieten jedoch die Garantie, daß es sich um Saatgut hochwertiger Sorten handelt, die unseren Boden- und Klimasowie Nutzungsverhältnissen angepasst sind und die, ertrags- und qualitätsmässig gesehen, überdurchschnittliche Leistungen aufzuweisen haben.

Orange Etikett

für höhere Erträge an Qualitätsfutter auf Weiden, Wiesen und Feld

- offiziell geprüft in mehrjährigen Versuchen
- hochwertige, an unsere Nutzungsverhältnisse angepaßte Sorten
- beste Leistungen in punkto Qualität und Ertrag

Qualitäts-Grünlandmischungen für Dauergrünland



présenté par la Zertifikationskommission:
ASTA, Lycée Technique Agricole, Chambre d'Agriculture

Qualitäts-Mischung 1 für Dauerweiden

	Gewicht %
Engl. Raygras Heutyp	23
Weidotyp	20
Wiesenschwingel	23
Timothee Weide-oder Zwischentyp	20
Wieserispse	6
Weißklee	8
(empfohlene Saatgutmenge: 35 kg/ha)	100

Qualitäts-Mischung 1A für intensive Dauerweiden

	Gewicht %
Engl. Raygras Heutyp	33
Weidotyp	37
Wiesenschwingel	15
Timothee Weide-oder Zwischentyp	15
(empfohlene Saatgutmenge: 35 kg/ha)	100

Qualitäts-Mischung 2 für Mähweiden
(1. Schnitt gemäht, Nachwuchs gemäht)

	Gewicht %
Engl. Raygras Heutyp	20
Weidotyp	20
Wiesenschwingel	30
Timothee	10
Timothee Weide-oder Zwischentyp	6
Wieserispse	6
Weißklee	8
(empfohlene Saatgutmenge: 35 kg/ha)	100

Qualitäts-Mischung 2A für intensive Mähweiden
(1. Schnitt gemäht, Nachwuchs gemäht)

	Gewicht %
Engl. Raygras Heutyp	35
Weidotyp	27
Wiesenschwingel	26
Timothee	7
Timothee Weide-oder Zwischentyp	5
(empfohlene Saatgutmenge: 35 kg/ha)	100

Qualitäts-Mischung 3 für Wechselgrünland
(für 3-bis 5-jährige Nutzung)

	Gewicht %
Engl. Raygras Heutyp	36
Wiesenschwingel	26
Timothee Heutyp	19
Weißklee	10
Rotklee	9
(empfohlene Saatgutmenge: 35 kg/ha)	100

Qualitäts-Mischung 3A für Wechselgrünland
(für 3-5-jährige Nutzung)

	Gewicht %
Engl. Raygras Heutyp	30
Wiesenschwingel Heutyp	15
Knautgras	9
Timothee Heutyp	16
Weißklee	10
Rotklee	9
(empfohlene Saatgutmenge: 35 kg/ha)	100

Nr. 4 Grasmischung für Nachsaaten (mit Klee)

	Gewicht %
Engl. Raygras Heutyp	40/50
Weißklee Weidotyp	50/40
	10/10
(empfohlene Saatgutmenge: 25 kg/ha)	100

Nr. 4A Grasmischung für Nachsaaten (ohne Klee)

	Gewicht %
Engl. Raygras Heutyp	60/40
Weidotyp	40/60
(empfohlene Saatgutmenge: 25 kg/ha)	100

Abhängig von der Nutzungsweise kann der Englisch Raygras-Anteil bei Nachsaatmischungen angepasst werden.

Nr. 5 Extensive Grünlandmischung

	Gewicht %
Engl. Raygras Heutyp	10
Weidotyp	15
Wiesenschwingel	25
Rotschwingel	15
Timothee (Heu- oder Zwischentyp)	12
Wieserispse	7
Rotklee	4
Weißklee	8
Hornschotenklee	4
(empfohlene Saatgutmenge: 35 kg/ha)	100

Grand-Duché de Luxembourg
Administration des services techniques de l'agriculture
0025512

REFERENZ Nr. 2010116

QUALITÄTS-GRÜNLANDMISCHUNG

Die mit dem ORANGEFARBENEN ETIKETT versehenen Grünlandmischungen setzen sich ausschließlich aus Samen von Gras- und Kleesorten zusammen, die in den amtlichen Anbauversuchen geprüft wurden und auf Grund ihrer Wertigenschaften empfohlen werden.

MELANGE FOURRAGER DE QUALITE

Les mélanges de semences fourragères pourvus de l'ÉTIQUETTE ORANGE se composent exclusivement de semences de variétés de graminées et de trèfles qui, sur base des résultats d'essais culturaux officiels, sont recommandées pour la culture.

496/2011



Luzernegrasanbau

Nr 6 Qualitäts-Luzernegrasmischung

	Gewicht %
Luzerne	83
Knautgras	17
(empfohlene Saatgutmenge: 29 kg/ha)	100

Nr 7 Qualitäts-Luzernegrasmischung

		Gewicht %
Luzerne		78
Wiesenschwingel	Heutyp	16
Timothee	Heutyp	6
(empfohlene Saatgutmenge: 29 kg/ha)		100

Kleegrasanbau 3-4 jährige Nutzung

Nr 10 Qualitäts-Kleegrasmischung

		Gewicht %
Wiesenschwingel	Heutyp	46
Timothee	Heutyp	27
Weißklee		27
(empfohlene Saatgutmenge: 22 kg/ha)		100

Nr 11 Qualitäts-Kleegrasmischung

		Gewicht %
Wiesenschwingel	Heutyp	37
Engl. Raygras	Heutyp	25
Timothee	Heutyp	16
Rotklee		13
Weißklee		9
(empfohlene Saatgutmenge: 32 kg/ha)		100

Nr 12 Qualitäts-Kleegrasmischung

		Gewicht %
Wiesenschwingel	Heutyp	38
Knautgras		9
Engl. Raygras	Heutyp	19
Timothee	Heutyp	19
Weißklee		15
(empfohlene Saatgutmenge: 32 kg/ha)		100

BESCHREIBENDE SORTENLISTE 2022

Zum Anbau in Luxemburg empfohlene
Sorten landwirtschaftlicher Nutzpflanzen

Die regelmäßig aktualisierte
„Beschreibende Sortenliste“
ist online abrufbar unter

www.sortenversuche.lu

Hier finden Sie Infos in Bild und Text zu den
Sortenversuchen von der Saat bis zur Ernte!

Présentéiert vun der
Zortekommissioun



Zortekommissioun

WINTERTRITICALE, WINTERROGGEN

Sorte	WINTERTRITICALE		WINTERROGGEN	
	BREHAT	RAMDAM*	DANKO GRANAT	SU PERFORMER
Züchter	DESPREZ	AGRI-OBTENTIONS	DANKO	SAATEN UNION
eingetragen	2020	2021	2020	2019
Populationsorte /Hybride			P	H
ERTRAGSSTRUKTUR				
TKG	7	7	4	6
Kornzahl/Ähre	-	-	-	5
Ertrag	6	9	3	8
ANBAUEIGENSCHAFTEN				
Standfestigkeit	9	9	8	8
Winterfestigkeit	9	9	7	8
Pflanzenlänge	7	7	3	2
Mähdruschreife	5	5	5	5
KRANKHEITSRESISTENZ				
Mehltau	8	6	8	6
Blattseptoria	-	6		
Braunrost	8	8	7	5
Gelbrost	8	6		
Rhynchosporium	6	-	7	6
AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)				
günstige Bedingungen	325	325	300	300

Legende: - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung; + = Angaben des Züchters

WINTERWEIZEN

Sorte	AXIOMA	GOVELINO	ASORY*	NORDKAP	CAMPESINO
Züchter	SECOBRA	GZ DARZAU	SECOBRA	SAATEN UNION	SECOBRA
eingetragen	2019	2017	2021	2019	2019
sm1-Resistenz	nein	nein	nein	nein	nein
Qualität	E	E	A	A	B

ERTRAGSSTRUKTUR

Sortentyp	Komp.	Komp.	EÄ	EÄ	Komp.
TKG	4	8	7	7	3
Kornzahl/Ähre	3	-	5	6	7
Ertrag	5	5	8	7	7

ANBAUEIGENSCHAFTEN

Standfestigkeit	9	9	9	9	9
Winterfestigkeit	8	9	8	8	8
Pflanzenlänge	2	5	4	4	3
Mähdruschreife	5	5	5	5	5

KRANKHEITSRESISTENZ

Mehltau	8	8	8	9	8
Blattseptoria	6	6	6	5	6
Braunrost	5	6	8	5	8
Gelbrost	8	4	7	8	8
Ährenfusarium	7	6	6	5	5

AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)

normale Bedingungen	350	350	350	350	350
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

BEMERKUNG

Stoppelweizen	-	-	ja	ja	ja
----------------------	---	---	----	----	----

Legende: - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung; sm1-Resistenz = Resistenz gegenüber der orangeroten Weizengallmücke (Sitodiplosis mosellana) - Larven zerstören Kornanlage in den Ähren; + = Angaben des Züchters

SOMMERGERSTE

Sorte	EUNOVA	APOLLON*
Züchter	PFLANZENZUCHT OBERLIMPURG	NORDSAAT
eingetragen	2015	2021
Qualität	FG	gelb

ERTRAGSSTRUKTUR

TKG	4	9
Ertrag	6	6-7

ANBAUEIGENSCHAFTEN

Standfestigkeit	8	8
Pflanzenlänge	5	4
Neigung zu Halmknicken	4	5
Neigung zu Ährenknicken	4	-
Mähdruschreife	5	5

KRANKHEITSRESISTENZ

Mehltau	8	6
Netzflecken	6	-
Rhynchosporium	6	-
Zwergrost	6	-

AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)

normale Bedingungen	325	350
----------------------------	-----	-----

SOMMERHAFER

SOMMERWEIZEN

Sorte	SHARKI	LICAMERO*
Züchter	KWS	SECOBRA
eingetragen	2019	2021
Qualität	E	A

ERTRAGSSTRUKTUR

TKG	6-7	6-7
Kornzahl/Ähre	3	5
Ertrag	5	6

ANBAUEIGENSCHAFTEN

Standfestigkeit	9	9
Pflanzenlänge	5	5
Mähdruschreife	5	5

KRANKHEITSRESISTENZ

Mehltau	5	4
Blattseptoria	6	5
Braunrost	5	7
Gelbrost	7	4
Ährenfusarium	5	4

AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)

günstige Bedingungen	400	400
-----------------------------	-----	-----

BEMERKUNG

Rohproteingehalt	-	-
-------------------------	---	---

Legende: FG = Futtergerste; BG = Braugerste; bf = braufähig; - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung

ERBSEN

ACKERBOHNEN

SOJABOHNEN

Sorte	ASTRONAUTE	FANFARE	ABELINA*
Züchter	NPZ	NPZ	SAATZUCHT DONAU
eingetragen	2015	2015	2021
Qualität			
ERTRAGSSTRUKTUR			
TKG	6	4	4
Kornzahl/Ähre	-	-	-
Ertrag	7	6	9
ANBAUEIGENSCHAFTEN			
Standfestigkeit	9	9	8
Pflanzenlänge	4	4	8
Mähdruschreife	4	5	4
Hülsenansatzhöhe	-	-	8
KRANKHEITSRESISTENZ			
Mehltau			
Blattseptoria			
Braunrost			
Gelbrost			
Ährenfusarium			
AUSSAATMENGE Körner/m² (abhängig von Saattermin und Bodenzustand)			
günstige Bedingungen	80	35	65
BEMERKUNG			
Rohproteingehalt	6	4	4

Legende: - = keine Daten vorhanden; nicht ausgefüllt = bedeutungslos; * = Neueintragung; (Astronauta/Fanfare) = 2019/2018 zuletzt geprüft; + = Angaben des Züchters



SPEISEKARTOFFEL

Sorte	Sehr frühe bis frühe Sorten		Mittelfrühe Sorten
	ANUSCHKA	BELANA	DÉSIRÉE
Züchter	KARTOFFEL- ZUCHT BÖHM	EUROPLANT	HZPC
Eintragung	2018 (BIO)	2018 (BIO)	2020 (BIO)
KNOLLENEIGENSCHAFTEN			
Knollenform	R-O	LO-O	LO
Kaliber	7	6	7
Schalenfarbe	G	G	R
Schale	gl-genetzt	gl-rau	gl-rau
Stoßanfälligkeit	5	5	4
Wachstumsstörungen	3	3	5
Lagerfähigkeit	6	6	5
ANBAUEIGENSCHAFTEN			
Reifetyp	fr	fr	mfr-msp
Ansatzzeit	fr	fr	mfr-fr
Knollenzahl	6	7	5
Ertrag	8	7-8	7
KRANKHEITSANFÄLLIGKEIT			
Krautfäulnis	5	3	5
Knollenfäulnis	4	3	3
G.Schorf	4	5	8
Alternaria	5	3	3
Rhizoctonia Beizung			
Keimung (Keimstimmung erforderlich)	-	api. Dominanz	-
SPEISE- UND VEREDLUNGSEIGENSCHAFTEN			
Fleischfarbe	G-TG	G	WG
Eisenfleckigkeit	5	4	4
Nachdunklung	2	4	2
Kochtyp	BA-B	BA-B	B-BC
Fritiereigenschaft	2	1	8
BEMERKUNG			
	glatte, gelbfleischige Salatkartoffel mit hohem Marktwarenertrag	wohl schmeckende formschöne Salatspeise-Kartoffel	alle Verwendungsmöglichkeiten

BESCHREIBENDE SORTENLISTE

Zum Anbau in Luxemburg empfohlene Sorten landwirtschaftlicher Nutzpflanzen

Die Wahl der richtigen Sorte ist eine wesentliche Voraussetzung für eine marktgerechte, wirtschaftliche und umweltverträgliche Produktion. Ertragsleistung und Produktqualität pflanzlicher Erzeugung können weitgehend durch eine standortgerechte und marktorientierte Sortenwahl abgesichert werden.

Sortenspezifische Anbauempfehlungen und zuverlässige Erkenntnisse über **Leistung** und **Eigenschaften** einer Sorte lassen sich nur anhand von **mehrfährigen und regionalen Sortenversuchen** erstellen.

In diesem Sinne werden jährlich Sortenversuche auf verschiedenen Standorten unseres Landes durchgeführt:

- vom Lycée Technique Agricole (LTA) in Getreide, Energiepflanzen, Ölfrüchten, Leguminosen und Kartoffeln
- von der Ackerbauverwaltung (ASTA) in Mais, Energiepflanzen, Futtergräsern und Kleearten
- vom Institut für Biologische Landwirtschaft und Agrarkultur Luxemburg (IBLA) in Getreide, Leguminosen und Kartoffeln gemäß den Anbauverhältnissen der „biologischen Landwirtschaft“

Ausgehend von diesen Versuchsergebnissen trägt die Sortenkommission dem **rasanten Fortschritt** in der Pflanzenzüchtung Rechnung und ermöglicht anhand der "Beschreibenden Sortenliste" eine **umfassende und neutrale** Übersicht über die verschiedenen Sorten.


Die angegebenen Werte sollen als Richtwerte verstanden werden, die auf die Standortbedingungen sowie die Ertragsersparnis abzustimmen sind.

Die Sortenkommission

Die regelmäßig aktualisierte „Beschreibende Sortenliste“ ist online abrufbar unter

www.lta.lu
www.asta.etat.lu
www.lwk.lu
www.ibla.lu

Ausführlichere Infos über die landwirtschaftlichen Sortenversuche von der Saat bis zur Ernte finden Sie zudem unter www.sortenversuche.lu



Bedeutung der Noten von 1 bis 9

Niedrige Noten bedeuten eine geringe und hohe Noten eine starke Ausprägung der Eigenschaft.

Beispiel:

Note 9: sehr gut, sehr hoch, sehr spät, sehr lang.

Note 1: sehr schlecht, sehr niedrig, sehr früh, sehr kurz.

Impressum:

Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA)

Lycée Technique Agricole (LTA)

Chambre d'agriculture

Institut fir Biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg (IBLA).

www.agriculture.public.lu

Auflage: 2500 Exemplare

Ausgabe: 02/2022